



SHILAP Revista de Lepidopterología

ISSN: 0300-5267

avives@eresmas.net

Sociedad Hispano-Luso-Americana de
Lepidopterología
España

Bentancur-Viglione, M. G.

Lista de los Papilionoidea y Hesperioidea del Uruguay (Insecta: Lepidoptera)
SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 37, núm. 145, marzo, 2009, pp. 23-40
Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología
Madrid, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45512048003>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Lista de los Papilionoidea y Hesperioidea del Uruguay (Insecta: Lepidoptera)

M. G. Bentancur-Viglione

Resumen

Se presenta una lista de 297 especies de lepidópteros de las superfamilias Hesperioidea y Papilionoidea citadas para el Uruguay, en los últimos 30 años. Se listaron las especies citadas en la bibliografía para el país, al igual que aquellas depositadas en las colecciones entomológicas del Uruguay.

PALABRAS CLAVE: Insecta, Lepidoptera, colecciones, Papilionoidea, Hesperioidea, Uruguay.

List of Papilionoidea and Hesperioidea of Uruguay (Insecta: Lepidoptera)

Abstract

A list of 297 species of lepidopteran superfamilies Hesperioidea and Papilionoidea cited for Uruguay in the past 30 years, is presented. It lists species cited in the literature for the country, as well as those deposited in the entomological collections of Uruguay.

KEY WORD: Insecta, Lepidoptera, collections, Papilionoidea, Hesperioidea, Uruguay.

Introducción

El Uruguay ocupa una región rica en diversidad biológica; con biotopos muy distintos. En los últimos años diferentes investigadores ARBALLO & CRAVINO (1999) han redefinido la fitogeografía del país, considerándolo dentro de una región transicional con 4 provincias involucradas: "Pampeana, Espinal, Paranense, Atlántica". Recientemente GRELA (2004) define las zonas fitogeográficas del Uruguay como: Región de transición chaqueño- Paranense; Provincia Paranense; Área con influencia del Cerrado, conformando un área de riqueza fitogeográfica muy particular, y potenciando la fauna de lepidópteros por la relación directa que existe entre los Lepidoptera y la flora.

Los Papilionoidea y Hesperioidea en particular, se destacan dentro de los Lepidoptera por su diversidad en la región Neotropical, que contiene el 35 % de la riqueza de lepidópteros del mundo (LAMAS, 2004). Estas superfamilias se caracterizan por sus hábitos: carroñeros, frutívoros, nectarívoros en su etapa de imago. Las últimas listas de especies de lepidópteros publicadas para el Uruguay datan de 1978 (BIENZANKO *et al.*). El objetivo de este estudio fue crear un inventario de las especies depositadas en las colecciones así como citadas en la bibliografía de las mariposas que se encuentran en el territorio uruguayo.

Material y métodos

Se consultaron las siguientes colecciones: Colección de Entomología de la Facultad de Ciencias (CEFC), Colección de Entomología de la Facultad de Agronomía (CEFA) y Colección del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

El Orden Lepidoptera está actualmente en revisión, con fusión y fisi3n de familias, subfamilias, géneros y especies, existiendo muchos puntos donde aún no hay consenso. En nuestro trabajo se siguió la sistemática de HEPPNER (1995) en general. Para la sistemática de cada familia se consultó: LAMAS (2004); CANALS (2000, 2003); TESTON (1998, 2000, 2001, 2002); SÁVELA (1999); PAS-TRANA (2004); BECCALONI (2005).

Resultado

En el último listado de BIEZANKO *et al.* (1978), se citan para el Uruguay una familia de Hesperioidea y 12 familias de Papilionoidea. De acuerdo a HEPPNER (1995), varias familias se fusionaron quedando 6 familias: Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Riodinidae y Hesperidae. Para el Uruguay se han registrado 172 géneros y 297 especies de Papilionoidea y Hesperioidea. El número de géneros y especies citados es el siguiente: Papilionidae 5 géneros y 13 especies; Pieridae 15 géneros y 27 especies; Nymphalidae 65 géneros y 107 especies; Lycaenidae 11 géneros y 23 especies; Riodinidae 14 géneros y 30 especies; Hesperidae 66 géneros y 97 especies.

Superfamilia Hesperioidea Latreille, 1802
 Familia Hesperidae Latreille, 1809
 Subfamilia Pyrrhopyginae Mabilie, 1878
 Tribu Pyrrhopygini Mabilie, 1878

Mysoria Watson, 1893
barcastus barta Evans, 1951 (CEFC)

Phyrrhopyge Hübner, [1819]
charybdis Westwood, 1852 (CEFC; CEFA)

Sarbia Watson, 1893
damipe Mabilie & Boulet, 1908

Subfamilia Pyrginae Burmeister, 1878
 Tribu Eudamini Burmeister, 1878

Aguna Williams, 1927
megaeles (Mabilie, 1888) (CEFC)

Astraptes Hübner, [1819]
fuligator (Walch, 1775)

Celaenorrhinus Hübner, [1819]
eligius punctiger (Burmeister, 1878)

Chiodes Lindsey, 1921
catillus (Cramer, 1779) (CEFC)

Epargyreus Hübner, [1819]
exadeus (Cramer, 1779)
socus Hübner, [1825]
tmolis (Burmeister, 1875) (CEFC)

Phocides Hübner, [1819]
charon (C. Felder & R. Felder, 1859)
polybius phanias (Burmeister, 1880) (CEFC; CEFA)

Polythrix Watson, 1893
octomaculata (Sepp, [1848])

Proteides Hübner, [1819]
mercurius (Fabricius, 1787)

Urbanus Hübner, [1807]
albmargo rica Evans, 1952 (CEFC)
dorantes (Stoll, 1790) (CEFC; CEFA)
esma Evans, 1952 (CEFC)
proteus (Linnaeus, 1758) (CEFC; CEFA)
simplicius (Stoll, 1790) (CEFC; CEFA)
teleus (Hübner, 1821) (CEFC)
zagorus Plötz, 1880 (CEFC; CEFA)

Tribu Pyrgini Burmeister, 1878

Achlyodes Hübner, [1819]
mithridates thraso (Hübner, [1807]) (CEFC)

Antigonus Hübner, [1819]
liborius areta Evans, 1953

Carrhenes Godman & Salvin, 1895
canescens pallida Röber, 1925 (CEFC)

Chiomara Godman & Salvin, 1899
asychis autander (Mabille, 1891) (CEFC)
mithrax (Möschler, 1879) (CEFC)

Ebrietas Godman & Salvin, 1896
anacreon (Staudinger, 1876)

Erynnis Schrank, 1801
funeralis (Scudder & Burgess, 1870)

Gesta Evans, 1953
austerus (Schaus, 1902)
gesta (Herrich-Schäffer, 1863)

Gogythion Godman & Salvin, 1896
begga (Prittwitz, 1868)
beggina Mabille, 1898 (CEFC)

Helias Fabricius, 1807
phalaenoides palpalis (Latreille, [1824])

- Heliopetes* Billberg, 1820
 arsalte (Linnaeus, 1758)
 domicella willi (Plötz, 1884)
 laviana libra Evans, 1944
 omrina (Butler, 1870) (CEFC; CEFA)
- Heliopyrgus* Herrera, 1957
 americanus bellatrix (Plötz, 1884) (CEFC; CEFA)
- Mylon* Godman & Salvin, 1894
 maimon (Fabricius, 1776) (CEFC)
- Nisoniades* Hübner, [1819]
 macarius (Herrich-Schäffer, 1870)
- Oechydrus* Watson, 1893
 chersis (Herrich-Schäffer, 1869) (CEFC)
- Pellicia* Herrich-Schäffer, 1870
 costimacula Herrich-Schäffer, 1870
- Pyrgus* Hübner, [1819]
 orcus (Stoll, [1780]) (CEFC; CEFA)
 orcynoides (Giacomelli, 1928) (CEFC; CEFA)
- Staphylus* Godman & Salvin, 1896
 incisus (Mabille, 1878)
 musculus (Burmeister, 1875)
- Theagenes* Godman & Salvin, 1896
 dichrous (Mabille, 1878) (CEFC)
- Timochares* Godman & Salvin, 1896
 trifasciata (Hewitson, 1868)
- Trina* Evans, 1953
 geometrina (C. Felder & R. Felder, 1867)
- Viola* Evans, 1953
 alicus (Schaus, 1902)
 minor (Hayward, 1933)

Subfamilia Hesperinae Latreille, 1809

- Ancyloxypha* C. Felder, 1862
 nitedula (Burmeister, 1878) (CEFC)
- Anthoptus* Bell, 1942
 epictetus (Fabricius, 1793)
- Appia* Evans, 1955
 appia Evans, 1955 (CEFC)

- Arotis* Mabille, 1904
derasa (Herrich-Schäffer, 1870)
- Callimormus* Scudder, 1872
corus Bell, 1941
interpunctata (Plötz, 1884)
rivera (Plötz, 1882)
- Calpodes* Hübner, [1819]
ethlius (Stoll, 1782) (CEFC; CEFA)
- Conga* Evans, 1955
chydaea (Butler, 1877) (CEFC)
iheringii (Mabille, 1891) (CEFC; CEFA)
zela (Plötz, 1883) (CEFC)
- Corticea* Evans, 1955
immocerinus (Hayward, 1934) (CEFC)
- Cymaenes* Scudder, 1872
distigma (Plötz, 1882)
odilia (Burmeister, 1878) (CEFC)
- Hylephila* Billberg, 1820
ancora (Plötz, 1883)
phylaeus (Drury, 1773) (CEFC; CEFA)
signata (Blanchard, 1852)
- Lerodea* Scudder, 1872
eufala (Edward, 1869) (CEFC)
- Mnasitheus* Godman, 1900
simplicissima (Herrich-Schäffer, 1870)
- Moeris* Godman, 1900
striga (Geyer, 1832)
- Monca* Evans, 1955
telata penda Evans, 1955
- Niconiades* Hübner, [1821]
xanthaphes Hübner, [1821]
- Nyctelius* Hayward, 1948
nyctelius (Latreille, [1824]) (CEFC)
- Panoquina* Hemming, 1934
lucas (Fabricius, 1793)
ocola (Edwards, 1863) (CEFC)
- Papias* Godman, 1900
phainis Godman, 1900

- Polites* Scudder, 1872
 vibex catilina (Plötz, 1886) (CEFC)
- Pompeius* Evans, 1955
 postpuncta (Draudt, 1923)
- Pseudosarbia* Berg, 1897
 phoenicicola Berg, 1897 (CEFC; CEFA)
- Pyrrhopygopsis* Godman, 1901
 socrates (Ménétriés, 1855)
- Quinta* Evans, 1955
 cannae (Herrich-Schäffer, 1869) (CEFC; CEFA)
- Saliana* Evans, 1955
 salius (Cramer, 1775)
- Saturnus* Evans, 1955
 reticulata conspicuos (Bell, 1941)
- Synale* Mabilie, 1904
 elana apheka (Kaye, 1918)
 sylvanus Hayward, 1948
- Synapte* Mabilie, 1904
 silius (Latreille, [1824])
- Thargella* Godman, 1900
 caura occulta (Schaus, 1902)
- Thespieus* Godman, 1900
 catochra (Plötz, 1882) (CEFC)
 jora Evans, 1955
 vividus (Mabilie, 1891)
 xarina Hayward, 1948
- Vehilius* Godman, 1900
 stictomenes (Butler, 1877)
- Vidius* Evans, 1955
 vidius (Mabilie, 1891)
- Vinius* Godman, 1900
 letis (Plötz, 1883)
 pulcherrimus Hayward, 1934
- Wallengrenia* Berg, 1897
 premnas (Wallengren, 1860) (CEFC)

Superfamilia Papilionoidea Latreille, [1802]
Familia Papilionidae Latreille, [1802]
Subfamilia Papilioninae Latreille, [1802]
Tribu Troidini Ford, 1944
Subtribu Battina Munroe & Ehrlich, 1960

Battus Scopoli, 1777

polydamas (Linnaeus, 1758) (CEFC; CEFA)
polystictus (Butler, 1784) (CEFA)

Subtribu Troidina Ford, 1944

Euryades C. Felder & R. Felder, 1864

corethrus (Boisduval, 1836) (CEFC; CEFA)
duponchelii (Lucas, 1839) (CEFC; CEFA)

Parides Hübner, [1819]

bunichus (Hübner, 1821) (CEFC; CEFA)
agavus (Drury, 1782)
nephalion (Godart, 1819)

Tribu Papilionini Latreille, [1802]

Heraclides Hübner, [1819]

anchisiades (Esper, 1788) (CEFC; CEFA)
astyalus (Godart, 1819) (CEFC; CEFA)
hectorides (Esper, 1794) (CEFC)
thoas brasiliensis (Rothschild & Jordan, 1906) (CEFC; CEFA)

Pterourus Scopoli, 1777

hellanichus (Hewitson, 1868) (CEFC)
menatius cleotas (Gray, 1832)

Familia Pieridae Duponchel, [1835]
Subfamilia Dismorphiinae Schatz, 1887

Pseudopieris Godman & Salvin, 1890

nehemia (Boisduval, 1836) (CEFC)

Dismorphia Hübner, 1816

astyocha (Hübner, [1831])

Enantia Hübner, [1819]

lina psamathe (Fabricius, 1793) (CEFC; CEFA)

Subfamilia Coliadinae Swainson, 1827

Colias Fabricius, 1807

lesbia (Fabricius, 1775) (CEFC; CEFA)

Anteos Hübner, [1819]

clorinde (Godart, [1824]) (CEFC)

Phoebis Hübner, [1819]

argante (Fabricius, 1775) (CEFC; CEFA)

neocypris (Hübner, [1823]) (CEFC)

philea (Linnaeus, 1763) (CEFC; CEFA)

sennae (Linnaeus, 1758) (CEFC; CEFA)

Rhabdodryas Godman & Salvin, 1889

trite (Linnaeus, 1758)

Aphrissa Butler, 1873

statira (Cramer, 1777) (CEFC)

Pyrisitia Butler, 1870

leuce (Boisduval, 1836) (CEFC)

nise tenella (Boisduval, 1836) (CEFA)

Eurema Hübner, [1819]

albula (Cramer, 1775) (CEFC; CEFA)

deva (Doubleday, 1847) (CEFC; CEFA)

elatheia (Cramer, 1777) (CEFC; CEFA)

Leucidia Boisduval, 1847

elvina (Godart, 1819) (CEFC)

Subfamilia Pierinae Duponchel, [1835]

Tribu Anthocharidini Tutt, 1894

Hesperocharis C. Felder, 1862

anguitea (Godart, 1819)

erota (Lucas, 1852) (CEFC)

Tribu Pierini Duponchel, [1835]

Pereute Herrich-Schäffer, 1867

antodyca (Boisduval, 1836)

swainsoni (Gray, 1832)

Glutophrissa Butler, 1887

drusilla (Cramer, 1777) (CEFC; CEFA)

Tatochila Butler, 1870

autodice (Hübner, 1818) (CEFC; CEFA)

Theochila Field, 1958

maenacte (Boisduval, 1836) (CEFC; CEFA)

Perrhybris Hübner, [1819]

pamela eieidias f. *pandora* Röber, 1908

Ascia Scopoli, 1777

monuste orseis (Godart, 1819) (CEFC; CEFA)

Ganyra Billberg, 1820
phaloe endeis (Godart, 1819)

Familia Lycaenidae Leach, 1815
 Subfamilia Theclinae Swainson, 1831
 Tribu Eumaeini Doubleday, 1847

Evenus Hübner, [1819]
latreillei (Hewitson, 1865)

Atlides Hübner, [1819]
thargelia (Burmeister, 1878)

Pseudolycaena Wallengren, 1858
marsyas (Linnaeus, 1758) (CEFC)

Rekoa Kaye, 1904
malina (Hewitson, 1867) (CEFC)

Arawacus Kaye, 1904
binangula (Schaus, 1902)

Chlorostrymon Clench, 1961
simaethis (Drury, 1773) (CEFC)
telea (Hewitson, 1868)

Cyanophrys Clench, 1961
acaste (Prittwitz, 1865) (CEFA)
herodotus (Fabricius, 1793) (CEFA)
pseudolongula (Clench, 1944)
remus (Hewitson, 1868) (CEFA)

Ziegleria Johnson, 1993
ceromia (Hewitson, 1877) (CEFC)

Calycopis Scudder, 1876
caulonia (Hewitson, 1877) (CEFC; CEFA)

Strymon Hübner, 1818
rufofusca (Hewitson, 1877) (CEFC; CEFA)
cestri (Reakirt, [1867])
bazochii (Godart, [1824]) (CEFC; CEFA)
eurytulus (Hübner, [1819]) (CEFC; CEFA)
oreala (Hewitson, 1868) (CEFC)
lucena (Hewitson, 1868)
megarus (Godart, [1824])

Ministrymon Clench, 1961
sanguinalis (Burmeister, 1878) (CEFC; CEFA)

Subfamilia Polyomatinae Swainson, 1827

Leptotes Scudder, 1876
cassius (Cramer, 1775) (CEFC; CEFA)

Zizula Chapman, 1910
cyna (Edwards, 1881)

Familia Riodinidae Grote, 1895
Subfamilia Euselasiinae Kirby, 1871
Tribu Euselasiini Kirby, 1871

Euselasia Hübner, [1819]
melaphaea (Hübner, 1823)
hygenius occulta Stichel, 1919 (CEFC)

Subfamilia Riodininae Grote, 1895
Tribu Riodinini Grote, 1895

Chorinea Gray, 1832
licursis (Fabricius, 1775) (CEFC)

Chalodeta Stichel, 1910
theodora (C. Felder & R. Felder, 1862) (CEFC)

Barbicornis Godart, [1824]
basilis Godart, [1824]

Seco Hall & Harvey, 2002
aphanis (Stichel, 1910)

Charis Hübner, [1819]
anius (Cramer, 1776)

Calephelis Grote & Robinson, 1869
argyrodines (Bates, 1866)

Lasaia Bates, 1868
incoides (Schaus, 1902)

Riodina Westwood, 1851
lycisca lysistratus Burmeister, 1878
lysippoides Berg, 1882 (CEFC; CEFA)

Melanis Hübner, [1819]
aegates cretiplaga (Stichel, 1910) (CEFC)

Tribu Incertae Sedis

Emesis Fabricius, 1807
diogenia Prittwitz, 1865 (CEFC ; CEFA)
ocypore zelotes Hewitson, 1872

Zabuella Stichel, 1911

tenellus (Burmeister, 1878) (CEFC)

Tribu Nymphidiini Bates, 1859

Subtribu Aricorina Harvey, 2002

Aricoris Westwood, 1851

signata (Stichel, 1910)

indistincta (Lathy, 1932) (CEFC)

hubrichi (Stichel, 1926) (CEFC)

campestris (Bates, 1868)

notialis (Stichel, 1910)

gauchoana (Stichel, 1910)

cinericia (Stichel, 1910)

erycina (Schweizer & Kay, 1941) (CEFC)

Subtribu Lemoniadina Kirby, 1871

Lemonias Hübner, [1807]

albofasciata (Godman, 1903)

Synargis Hübner, [1819]

axenus (Hewitson, 1865) (CEFC)

Subtribu Nymphidiina Bates, 1859

Adelotypa Warren, 1895

tinea (Bates, 1868)

bolena (Butler, 1867)

Familia Nymphalidae Rafinesque, 1815

Subfamilia Libytheinae Boisduval, [1833]

Libytheana Michener, 1943

carinenta (Cramer, 1777) (CEFC)

Subfamilia Danainae Boisduval, [1833]

Tribu Euploeini Moore, 1880

Subtribu Itunina Reuter, 1896

Lycorea Doubleday, 1847

ilione (Cramer, 1775)

Tribu Danaini Boisduval, [1833]

Subtribu Danaina Boisduval, [1833]

Danaus Kluk, 1802

eresimus plexaure (Godart, 1819) (CEFC; CEFA)

erippus (Cramer, 1775) (CEFC; CEFA)

gilippus (Cramer, 1775) (CEFC)

Subfamilia Ithomiinae Doherty, 1891
Tribu Mechanitini Berg, 1897

Methona Doubleday 1847
themisto (Hübner, 1818) (CEFC; CEFA)

Mechanitis Fabricius, 1807
lysinnia (Fabricius, 1793)

Tribu Napeogenini Fox, 1956

Epityches D'Almeida, 1938
eupompe (Geyer, 1832) (CEFC)

Tribu Ithomiini Doherty, 1891

Placidina D'Almeida, 1928
euryanassa (C. Felder & R. Felder, 1860)

Tribu Dircennini D'Almeida, 1941

Dircenna Doubleday, 1847
dero (Hübner, 1823) (CEFC)

Episcada Godman & Salvin, 1879
carcinia Schaus, 1902
hymenaea (Prittwitz, 1865) (CEFC; CEFA)
philoclea (Hewitson, [1855]) (CEFC)

Pteronymia Butler & Druce, 1872
simplex (Salvin, 1869)

Tribu Godyridini D'Almeida, 1941

Pseudoscada Godman & Salvin, 1879
erruca (Hewitson, 1855) (CEFC)

Subfamilia Morphinae Newman, 1834
Tribu Morphini Newman, 1834
Subtribu Morphina Newman, 1834

Morpho Fabricius, 1807
epistrophus catenaria (Perry, 1811) (CEFC; CEFA)

Tribu Brassolini Boisduval, 1836
Subtribu Brassolina Boisduval, 1836

Blepolenis Röber, 1906
batea (Hübner, [1821])

Brassolis Fabricius, 1807
astyra Godart, [1824]

Opsiphanes Doubleday, [1849]
invirae amplificatus Stichel, 1904

Subfamilia Satyrinae Boisduval, [1833]
 Tribu Elymniini Herrich-Schäffer, 1864
 Subtribu Parargina Tutt, 1896

Manataria Kirby, 1900
hercyna (Hübner, [1821]) (CEFA)

Tribu Satyrini Boisduval, [1833]
 Subtribu Pronophilina Reuter, 1896

Pedaliodes Butler, 1867
porina (Hewitson, 1862)

Praepedaliodes Forster, 1964
phanias (Hewitson, 1862) (CEFC)

Subtribu Hypocystina Miller, 1968

Etcheverius Herrera, 1965
tandilensis (Köhler, 1935)

Haywardella Herrera, 1966
edmondsii (Butler, 1881) (CEFC)

Pampasatyrus Hayward, 1953
gyrtone (Berg, 1877)
nilesi (Weeks, 1901)
periphas (Godart, [1824]) (CEFC; CEFA)
quies (Berg, 1877) (CEFC; CEFA)

Subtribu Euptychiina Reuter, 1896

Capronnieria Forster, 1964
galesus (Godart, [1824])

Hermeuptychia Forster, 1964
hermes (Fabricius, 1775) (CEFC; CEFA)

Moneuptychia Forster, 1964
soter (Butler, 1877)

Paryphthimoides Forster, 1964
eous (Butler, 1867) (CEFC; CEFA)
phronius (Godart, [1824])
polys (Prittwitz, 1865) (CEFC)

Pharneuptychia Forster, 1964
innocentia (C. Felder & R. Felder, 1867) (CEFC)
phares (Godart, [1824]) (CEFC)

Taygetis Hübner, [1819]
yphthima Hübner, [1821]

Yphthimoides Forster, 1964
celmis (Godart, [1824]) (CEFC; CEFA)

Subfamilia Charaxinae Doherty, 1886
Tribu Anaeini Reuter, 1896

Hypna Hübner, [1819]
clytemnestra huebneri Butler, 1866

Fountainea Rydon, 1971
glycerium (Doubleday, [1849])
ryphea (Cramer, 1775) (CEFC)

Memphis Hübner, [1819]
moruus (Fabricius, 1715) (CEFC)

Subfamilia Biblidinae Boisduval, 1833
Tribu Cyrestini Guenée, 1865

Marpesia Hübner, 1818
chiron (Fabricius, 1775)
petreus (Cramer, 1776) (CEFC)

Tribu Biblidini Boisduval, 1833
Subtribu Biblidini Boisduval, 1833

Biblis Fabricius, 1807
hyperia (Cramer, 1779) (CEFC; CEFA)

Subtribu Eurytelina Doubleday, 1844

Mestra Hübner, [1825]
dorcas apicalis (Staudinger, 1886)

Subtribu Epicaliina Guenée, 1865

Eunica Hübner, [1819]
maja (Fabricius, 1775) (CEFC)
margarita (Godart, [1824]) (CEFC; CEFA)
tatila bellaria Fruhstorfer, 1908 (CEFC)

Subtribu Ageroniina Doubleday, [1847]

Hamadryas Hübner, [1806]
amphinome (Linnaeus, 1767) (CEFC)
epinome (C. Felder & R. Felder, 1867) (CEFC)
februa (Hübner, [1823])
feronia (Linnaeus, 1758)

Subtribu Epiphilina Jenkins, 1987

Epiphile Doubleday, [1845]
hubneri Hewitson, 1861

Subtribu Eubagina Burmeister, 1878

Dynamine Hübner, [1819]
agacles (Dalman, 1823) (CEFC; CEFA)
myrrhina (Doubleday, 1849) (CEFC; CEFA)
tithia (Hübner, 1823)

Subtribu Callicorina Orfila, 1952

Callicore Hübner, [1819]
hydaspes (Drury, 1782)
sorana (Godart, [1824])

Diaethria Billberg, 1820
candrena (Godart, [1824]) (CEFC; CEFA)
clymena meridionalis (Bates, 1864)

Haematera Doubleday, 1849
pyrame (Hübner, [1819])

Subfamilia Apaturinae Boisduval, 1840

Doxocopa Hübner, [1819]
kallima (Staudinger, 1886) (CEFC)
laurentia (Godart, [1824]) (CEFC; CEFA)
linda mileta (Boisduval, 1870) (CEFC)

Subfamilia Nymphalinae Swainson, 1827
Tribu Coeini Scudder, 1893

Smyrna Hübner, [1823]
blomfildia (Fabricius, 1781)

Tribu Nymphalini Swainson, 1827

Hypanartia Hübner, [1821]
bella (Fabricius, 1793)
lethe (Fabricius, 1793) (CEFC)

Vanessa Fabricius, 1807
braziliensis (Moore, 1883) (CEFC; CEFA)
carye (Hübner, [1812]) (CEFC; CEFA)
myrinna (Doubleday, 1849)

Tribu Kallimini Doherty, 1886

Anartia Hübner, [1819]

amathea (Linnaeus, 1758) (CEFC; CEFA)

jatrophae (Linnaeus, 1763) (CEFC; CEFA)

Junonia Hübner, [1819]

genoveva hilaris (C. Felder & R. Felder, 1867) (CEFC; CEFA)

Siproeta Hübner, [1823]

epaphus trayja Hübner, [1823]

stelenes (Linnaeus, 1758)

Tribu Melitaeini Newman, 1869

Chlosyne Butler, 1870

lacinia saundersi (Doubleday, [1847])

Subtribu Phyciodina Higgins, 1981

Eresia Boisduval, 1836

lansdorfi (Godart, 1819) (CEFC)

Ortilia Higgins, 1981

ithra (Kirby, 1900) (CEFC; CEFA)

liriope (Cramer, 1775)

orthia (Hewitson, 1864) (CEFC; CEFA)

velica durnfordi (Godman & Salvin, 1878) (CEFC; CEFA)

Phystis Higgins, 1981

simois variegata (Röber, 1913) (CEFC)

Tegosa Higgins, 1981

claudina (Eschscholtz, 1821) (CEFC; CEFA)

orobia ursula (Staudinger, 1894) (CEFC)

Subfamilia Limenitidinae Butler, [1870]

Tribu Limenitidini Butler, [1870]

Adelpha Hübner, [1819]

epizygis Fruhstorfer, 1915 (CEFC)

hyas (Doyère, [1840]) (CEFC)

syma (Godart, [1824]) (CEFC)

thessalia indefecta Fruhstorfer, 1913

zea (Hewitson, 1850)

Subfamilia Heliconiinae Swainson, 1827

Tribu Argynnini Duponchel, [1835]

Euptoieta Doubleday, 1848

hortensia (Blanchard, 1852) (CEFC; CEFA)

Tribu Acraeini Boisduval, 1833

Actinote Hübner, [1819]

- carycina* Jordan, 1913 (CEFC)
- mamita* (Burmeister, 1861) (CEFC; CEFA)
- melanisans* Oberthür, 1917
- parapheles* Jordan, 1913
- pelleneae* Hübner, [1821] (CEFC)
- surima* (Schaus, 1902)
- thalia pyrrha* (Fabricius, 1775) (CEFC)

Tribu Heliconiini Swainson, 1827

Agraulis Boisduval & Le Conte, [1835]

- vanillae* (Linnaeus, 1758) (CEFC; CEFA)

Dione Hübner, [1819]

- juno* (Cramer, 1779) (CEFC; CEFA)
- moneta* Hübner, [1825]

Dryadula Michener, 1942

- phaetusa* (Linnaeus, 1758) (CEFC)

Dryas Hübner, [1807]

- iulia* (Fabricius, 1775) (CEFC; CEFA)

Philaetria Billberg, 1820

- wernickei* (Röber, 1906)

Eueides Hübner, 1816

- isabella* (Stoll, 1781)

Heliconius Kluk, 1780

- erato phyllis* (Fabricius, 1775) (CEFC; CEFA)

BIBLIOGRAFÍA

- ARBALLO, E. & CRAVINO, J., 1999.— *Aves del Uruguay. Manual ornitológico*, 1: 465 pp. Hemisferio Sur S. R. L. Montevideo.
- BECCALONI, G., SCOBLE, M., ROBINSON, G. & PITHIN, B., 2003.— *The global Lepidoptera Names Index*. World Wide Web electronic publication. <http://www.nhm.ac.uk/entomology/lepindex> (acceso mayo 2008)
- BENTANCOURT, C. & SCATONI, I., 2002.— Primer registro para Uruguay de *Brassolis astyra* (Lepidoptera, Nymphalidae, Brassoliniæ).— *Agrociencia*, **6**(2): 87-89.
- BIEZANKO, C. & RUFFINELLI, A., 1962.— Lepidópteros Americanos de la colección de la Cátedra de Entomología. Estudio sobre la colección Herbon.— *Revta Fac. Agron.*, **50**: 119-166.
- BIEZANKO, C., RUFFINELLI, A. & CARBONELL, C., 1957.— Lepidoptera del Uruguay. Lista anotada de especies.— *Revta Fac. Agron.*, **46**: 1-152.
- BIEZANKO, C., RUFFINELLI, A. & CARBONELL, C., 1962.— Lepidoptera del Uruguay. Notas complementarias I y II.— *Revta Fac. Agron.*, **50**: 1-45.
- BIEZANKO, C., RUFFINELLI, A. & LINK, D., 1978.— Catálogo de lepidópteros do Uruguai.— *Revta Cent. Ciênc. Rurais*, **8** (Suplemento): 1-84.
- CANALS, G., 2000.— *Mariposas Bonaerenses*: 347 pp. Literature of Latin América, Buenos Aires.

- CANALS, G., 2003.— *Mariposas de Misiones*: 476 pp. Literature of Latin América, Buenos Aires.
- GRELA, I., 2004.— *Geografía florística de las especies arbóreas de Uruguay: propuesta para la delimitación de dendrofloras*. Tesis de maestría en Ciencias Biológicas. Pedeciba.
- HEPPNER, J. B., 1984.— *Atlas of Neotropical Lepidoptera Part I. Micropterigoidea - Immoidea*: XXVII + 112 pp. Dr. W. Junk Publishers, The Hague - Boston - Lancaster.
- HEPPNER, J. B., 1995.— *Atlas of Neotropical Lepidoptera. Checklist: Part 2 Hyblaeoidea - Pyralioidea - Tortricoidae*: LIV + 243 pp. Association for Tropical Lepidoptera, Gainesville.
- HEPPNER, J. B., 1996.— *Atlas of Neotropical Lepidoptera Part 4B Drepanioidea - Bombycoidea - Sphingoidea*: XLX + 87 pp. Association for Tropical Lepidoptera, Gainesville.
- LAMAS, G., 2000.— Estado actual del conocimiento de la sistemática de los lepidópteros, con especial referencia a la región Neotropical.— *Monografía SEA*, 1: 253-260.
- LAMAS, G., 2004.— *Atlas of Neotropical Lepidoptera. Checklist: Part 4A. Hesperioidea - Papilionoidea*: XXXVI + 439 pp. Association for Tropical Lepidoptera, Gainesville.
- PASTRANA, J. A., 2004.— *Los lepidópteros argentinos. Sus plantas hospedadoras y otros sustratos alimenticios*.— In K. BRAUN, G. LOGARZO, H. A. CORDO & O. R. DI LORIO (coordinadores): VIII.+ 334 pp. Sociedad entomológica Argentina ediciones.
- SAVELA, M., 1999.— *Lepidoptera and some other life forms*: <http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/index.htm> (acceso mayo 2008).
- TESTON, J. A. & CORSEUIL, E., 1998.— Lista documentada Dos Papilionidos do Rio Grande do Sul, Brasil.— *Biociencias*, 6(2): 81-94.
- TESTON, J. A. & CORSEUIL, E., 2000.— Lista documentada Dos Pieridos do Rio Grande do Sul, Brasil.— *Biociencias*, 8(2): 115-132.
- TESTON, J. A. & CORSEUIL, E., 2001.— Ninfalídeos (Lepidoptera, Nymphalidae) ocorrentes no Río Grande do Sul, Brasil. Parte I. Danainae e Ithomiinae.— *Biociencias*, 9(1): 51-61.
- TESTON, J. A. & CORSEUIL, E., 2002.— Ninfalídeos (Lepidoptera, Nymphalidae) ocorrentes no Río Grande do Sul, Brasil. Parte II. Brassolinae e Morphinae.— *Biociencias*, 10(1): 75-84.

M. G. B.-V.
Sección Entomología
Facultad de Ciencias
Igúa 4225, CP 11400
Montevideo
URUGUAY / URUGUAY
E-mail: gbentancur@fcien.edu.uy

(Recibido para publicación / Received for publication 6-VIII-2008)

(Revisado y aceptado / Revised and accepted 30-VIII-2008)